L'Universo primordiale: la produzione del Quark Gluon Plasma in ALICE-LHC

Pasquale Di Nezza

11th International Masterclasses
hands on Particle Physics

A Large Ion Collider Experiment

European Organisation for Nuclear Research

Detector:
Size: 16 x 26 meters
Weight: 10,000 tons

Collaboration:
 > 1300 Members
 > 100 Institutes
 > 30 countries

Comprendere i primissimi istanti di vita del nostro Universo dopo il Big Bang

History of the Universe

Source: Nuclear Science Wall Chart

Fino a circa un centomillesimo di secondo dal Big Bang (10^{-37} - 10^{-5} s) l'Universo era formato da una "zuppa" di quark e gluoni ... il Quark Gluon Plasma (QGP)

- Perchè studiare il QGP?
- Quali sono le caratteristiche del QGP?
- E' possibile riprodurlo in laboratorio?

Libertà Asintotica → Confinamento

$$V_{\text{Coulomb}} \propto \frac{q_1 q_2}{r}$$

$$V_{\text{QCD}} \propto e^{k \cdot r}$$

Allontanando i quark, si crea una tensione con energia sufficiente a creare altre particelle (1000 MeV / fm)

Adronizzazione

Bisogna creare un sistema che abbia una densità enorme (ptc a distanza infinitesima) tale da rendere trascurabile l'interazione forte

adroni

ENERGIA

Quark Gluon Plasma

Nobel Prize 2005

**D. Gross
H.D. Politzer
F. Wilczek**

QCD Asymptotic Freedom (1973)

“Before [QCD] we could not go back further than 200,000 years after the Big Bang. Today...since QCD simplifies at high energy, we can extrapolate to very early times when nucleons melted...to form a quark-gluon plasma.”

David Gross, Nobel Lecture (RMP 05)

Fasi della materia "normale"

Phase Diagram - Water

Plasma Classico

Phase Diagram of QCD Matter

Una "zuppa" ricca di informazioni

Flusso ellittico

Evoluzione spazio-temporale della nascita di un adrone

Proprietà della QCD ad alte temperature: gradi di libertà, viscosità, conduttività, ...

Restaurazione della simmetria chirale

Instabilità di plasma, caos di colore

Freezout

Puzzle barionico

Transizione di fase q-g nelle teorie cosmologiche dell'Universo primordiale

Equazione di stato della QCD

Perdita di energia partonica

Composizione chimica

Dove si produce il QGP ?

Complesso degli acceleratori del CERN

LHC, il più potente acceleratore del mondo

Anello di LHC:
27 km di circonferenza

Colliders

LHC at CERN, Geneve 2009

The global adventure

Everything started more than 20 years ago

ALICE: A Large Ion Collider Experiment

Alice è l'unico esperimento a LHC dedicato alla fisica con fasci di ioni (5.5 TeV PbPb)

200 fisici Italiani: BA, BO, CA, CT, LNF, LNL, PD, RM1, SA, TO, TS

Un Mini-Bang in laboratorio

- Abbiamo bisogno di un “sistema piccolo” tale da poterlo accelerare a velocità ultrarelativistiche (99.9% c)
- Tale sistema (p.es. una quantità microscopica di materia e non una sola particella) deve poter seguire semplici regole termodinamiche e poter formare nuovi stati di materia sotto particolari condizioni
- Possiamo usare “ioni pesanti” (p.es. Pb); sono piccoli abbastanza ($\sim 10^{-14}$ m) ma hanno un volume finito tali da poterli sottoporre a misure/variazione di pressione e temperatura

Proveremo a forzare la materia, attraverso una transizione di fase, a passare in un nuovo stato: il “Quark Gluon Plasma”

QGP attraverso gli Heavy Ions

2 nuclei di
Piombo
collidono ad
altissima
energia
creando
un sistema ad
altissima densità

Pb+Pb $E_{cm}=5.5$ TeV

$t=-19,00$ fm/c

La collisione in Alice

Lo spettrometro

Size: 16 x 26 meters
Weight: 10,000 tons
Detectors: 18

○ : Rivelatori sotto la completa o parziale responsabilità INFN

Eventi pp in Alice

Eventi PbPb in Alice

Migliaia di tracce prodotte ad ogni interazione (25 ns)

Dati sperimentali all'LHC

- La quantità dei dati prodotta è enorme! ~ 1.3 GB/s
- Se dovessimo salvare i dati su CD produrremmo una colonna di 20 km di dischi ogni l'anno
- Nuova soluzione sviluppata: GRID

GRID architecture

Selezione di tracce “buone”

Eccellente
tracking +
vertice +
Identificazione
di particelle
(PID)

$$\pi(u\bar{u})$$

$$K_s(d\bar{s})$$

$$p(uud)$$

$$n(udd)$$

$$\Lambda(uds)$$

$$K_s^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$$

$$\tau = 0.89 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$c\tau = 3 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1} \times 0.89 \times 10^{-10} \text{ s} = 2.67 \text{ cm dal punto d'interazione}$$

$$\Lambda \rightarrow \pi^- p$$

$$\tau = 2.6 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$c\tau = 3 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1} \times 10^{-9} \text{ s} = 7.2 \text{ cm dal punto d'interazione}$$

Identifica
la carica

Misura
l'impulso

Simmetrico

Asimmetrico

Seconda parte

- Analisi di un campione di migliaia di eventi
- Riempire gli istogrammi di massa invariante per K_S , Λ anti- Λ
- Fit del fondo (background) con polinomio di secondo e segnale (gaussiana)
- Trovare il numero di K_S , Λ , anti- Λ dopo la sottrazione del fondo in differenti bin di centralità nelle collisioni Pb-Pb

Centrality	$dN_{ch}/d\eta$	$\langle N_{part} \rangle$	$(dN_{ch}/d\eta)/(\langle N_{part} \rangle/2)$
0%–5%	1601 ± 60	382.8 ± 3.1	8.4 ± 0.3
5%–10%	1294 ± 49	329.7 ± 4.6	7.9 ± 0.3
10%–20%	966 ± 37	260.5 ± 4.4	7.4 ± 0.3
20%–30%	649 ± 23	186.4 ± 3.9	7.0 ± 0.3
30%–40%	426 ± 15	128.9 ± 3.3	6.6 ± 0.3
40%–50%	261 ± 9	85.0 ± 2.6	6.1 ± 0.3
50%–60%	149 ± 6	52.8 ± 2.0	5.7 ± 0.3
60%–70%	76 ± 4	30.0 ± 1.3	5.1 ± 0.3
70%–80%	35 ± 2	15.8 ± 0.6	4.4 ± 0.4

Student

ALICE official V0 selection

Analyse VOs in 2000 events

Analyse Kaons

Analyse Lambdas

Choose kaon cent(32):

0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
50-60	60-70	70-80	80-90	90-100

Choose lambda cent(32):

0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
50-60	60-70	70-80	80-90	90-100

Choose antilambda cent(32):

0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
50-60	60-70	70-80	80-90	90-100

Fit

Bkg range: 1.100 1.609

Sig range: 1.100 1.141

Fit signal+background

Save results

1 2 3 4 Teacher

← K_s

Sinistra: 0-10% centralità

Destra: 50-60% centralità

← Λ

Sinistra: 0-10% centralità

Destra: 50-60% centralità

Exit

centrality	<Npart>	Nevents	NKs	efficiency Ks	yield Ks	Ks enhancem
0-10	360	213	4816	0.26	86.963	1.933
10-20	260	290	4638	0.26	61.512	1.893
20-30	186	302	3750	0.29	42.818	1.842
30-40	129	310	2610	0.29	29.032	1.800
40-50	85	302	1493	0.29	17.047	1.604
50-60	52	300	777	0.29	8.931	1.374
60-70	30	315	409	0.35	3.710	0.989
70-80	16	350	149	0.26	1.637	0.819

Efficienza = $N_{\text{particelle(misurate)}} / N_{\text{particelle(prodotte)}}$

Yield : numero di particelle prodotte per interazione

Yield = $N_{\text{particelle(prodotte)}} / N_{\text{eventi}} = N_{\text{particelle(misurate)}} / (\text{efficienza} \times N_{\text{eventi}})$

Strangeness enhancement: yield per particella normalizzato al numero di nucleoni partecipanti nella collisione e diviso per lo yield delle collisioni protone-protone

K_s -Yield (pp) = 0.25 /interazione ; Λ -Yield(pp) = 0.0617 /interazione ; $\langle N_{\text{part}} \rangle = 2$ per pp

Dove scaricare il materiale

<http://alice.physicsmasterclasses.org/MasterClassWebpage.html>

Video: Inside the ALICE experiment

<https://www.youtube.com/watch?v=NFRSX00qeIU>